

FICHA TÉCNICA

MAGNESIUM GLUCONATE 550 MG TABLETS  
(GLUCONATO DE MAGNESIO 550 MG EN TABLETAS)

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO:

- NOMBRE COMERCIAL:  
MAGNESIUM GLUCONATE 550 MG
- FORMA:  
Tabletas
- CATEGORÍA:  
Suplemento Dietario
- FÓRMULA CUALICUANTITATIVA:

Cada tableta contiene:

Ingrediente activo	Cantidad	Unidad
Gluconato de Magnesio	550	mg
(equivalente a Magnesio elemental)	30	mg



OTROS INGREDIENTES:

Maltodextrina, ácido esteárico, celulosa microcristalina estearato de magnesio vegetal.

FABRICANTE:

Mason Vitamins, Inc. Miami Lakes, Florida 33014, Estados Unidos

PAÍS DE ORIGEN:

Estados Unidos

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Apariencia: Tabletas
- Color: Blanco
- Forma: Redonda

## 2. INFORMACIÓN TÉCNICA:

### RECOMENDACIONES DE USO:

Suplemento dietario para prevenir o tratar la deficiencia de magnesio. Puede ayudar en el mantenimiento de la función neuromuscular, la salud ósea, la regulación de la presión arterial, y el alivio de síntomas premenstruales, entre otros.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

### INSTRUCCIONES DE USO:

- Adultos: 1 tableta al día, preferentemente con alimentos, como suplemento dietario.

### CONTRAINDICACIONES:

- Hipersensibilidad al gluconato de magnesio o a cualquier componente de la fórmula.
- Insuficiencia renal grave, enfermedad cardíaca avanzada, bloqueo cardíaco.
- Pacientes en coma o con ileo paralítico.

### PRECAUCIONES:

- No exceder la dosis diaria recomendada.
- Uso con precaución en pacientes con función renal alterada.
- Embarazo y lactancia: consultar con un médico antes de usar.

otros.

- Suspender su uso y consultar a un médico si se presentan reacciones adversas.

#### ADVERTENCIAS:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada.
- Este producto es un suplemento dietético y no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

#### EFFECTOS ADVERSOS:

En general, bien tolerado a dosis recomendadas. En casos de sobredosis o en pacientes con insuficiencia renal pueden presentarse:

- Diarrea, náuseas, malestar gastrointestinal.
- Síntomas de hipermagnesemia: debilidad muscular, hipotensión, bradicardia, depresión respiratoria.

#### PRESENTACIÓN:

**Frasco de color ámbar con tapa color amarillo, contiene 100 tabletas.**

#### MODALIDAD DE VENTA:

Venta libre

#### VIDA ÚTIL:

3 años

#### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar seco, a temperatura ambiente controlada (20°–25°C / 68°–77°F). Proteger de la luz y la humedad.

#### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. Merck & CO Ing. The Merck Index, Thirteenth Edition Whitehouse Starion, NJ 2,001
2. MARTINDALE Thirty-Third Edition The Complete Drug Reference edited By Sean C Sweetman Bpharm, MRPharmS, Published by the Pharmaceutical Press 2,002.